

Ortiva® Rosen-Pilzschutz (Fungizid, Pilzmittel)

Anwendungsgebiete

Ortiva ist ein Mittel aus der **Azoxystrobin Wirkstoffgruppe**.

Das Mittel wird eingesetzt gegen Echten Mehltau, Rost, Sternrußtau, Blattflecken, Falschen Mehltau sowie Kraut- und Braunfäule an Gemüse und Zierpflanzen.

Bitte beachten Sie, dass bei einem Wechsel des Pilzmittels auch ein Wechsel der Wirkstoffgruppe erfolgen sollte. Wird dies nicht beachtet, kommt es zu einer Resistenzbildung.

Die Anwendung muss mit einem Abstand von mindestens 5m zu Gewässern erfolgen, da das Mittel giftig für Wasserorganismen ist.

Anwendung

Bei Zierpflanzen und Spargel im Freiland sowie an Tomaten und Gurken unter Glas

- wird das Mittel mit 0,08% (0,8ml / 1 Liter Wasser) gespritzt
- darf das Mittel max. 2 x / Jahr eingesetzt werden
- bis 50 cm Pflanzenhöhe wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 16m² gespritzt
- bis 125 cm Pflanzenhöhe wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 11,2 m² gespritzt
- über 125 cm Pflanzenhöhe wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 8,4 m² gespritzt
- Wartezeit bis zur Ernte der Früchte 3 Tage

Bei Gurken und Zucchini im Freiland

- wird das Mittel mit 0,16% (1,6ml / 1 Liter Wasser) gespritzt
- darf das Mittel max. 2 x / Jahr eingesetzt werden
- bis 50 cm Pflanzenhöhe wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 16m² gespritzt
- Wartezeit bis zur Ernte der Früchte 3 Tage

Anwendung der Spritzbrühe

- Während der Arbeit nicht essen und trinken
- Handschuhe, festes Schuhwerk und geschlossene Kleidung tragen
- Hälfte des Wassers in die Spritze füllen
- Mittel unter Rühren hinzugeben
- Rest Wasser hinzugeben
- Pflanzen behandeln
- Sollten Reste der Spritzbrühe überbleiben, auf der kompletten behandelten Fläche erneut ausbringen.
- Danach die Spritze mit klarem Wasser füllen und auf der vorher behandelten Fläche leer spritzen