

Rosen-Pilzschutz M (Fungizid, Pilzmittel)

Anwendungsgebiet

Pilzschutz M ist ein Mittel aus der **Triazol Wirkstoffgruppe**

Das Mittel wird eingesetzt gegen Mehltau, Rost, Sternrußtau, Schorf, und Spitzendürre (Monilia), an Zierpflanzen, Äpfel, Sauerkirsche und Wein.

Bitte beachten Sie, dass bei einem Wechsel des Pilzmittels auch ein Wechsel der Wirkstoffgruppe erfolgen sollte. Wird dies nicht beachtet, kommt es zu einer Resistenzbildung.

Die Anwendung muss mit einem Abstand von mindestens 5m zu Gewässern erfolgen, da das Mittel giftig für Wasserorganismen ist.

Anwendung

Bei Mehltau, Sternrußtau, Rost an Zierpflanzen

- wird das Mittel mit 0,1% (10ml / 1 Liter Wasser) gespritzt
- darf das Mittel max. 3 / Jahr eingesetzt werden
- bis 50 cm Pflanzhöhe wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 10m² gespritzt
- bis 125 cm Pflanzhöhe wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 8,3 m² gespritzt

Bei Spitzendürre (Monillia)

- wird das Mittel 0,12% (12ml / 1 Liter Wasser) gespritzt
- darf das Mittel max. 3 / Jahr eingesetzt werden.
- muss mit der Ernte der Früchte mindestens 21 Tage gewartet werden.
- wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 20m² und je 1m Kronenhöhe gespritzt
- z.B. Buchsbaum 3m hoch Standraum 4 x 4 m = 16m² = 80% bzw. 0,8 (von 20m² (16/20) = 3 m * 1Liter * 0,8(80%) = 2,4 l Spritzbrühe

Bei Mehltau und / oder Schorf an Äpfeln

- wird das Mittel 0,1% (10ml / 1 Liter Wasser) gespritzt
- darf das Mittel max. 6 x / Jahr eingesetzt werden.
- muss mit der Ernte der Früchte mindestens 14 Tage gewartet werden.
- wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 30m² und je 1m Kronenhöhe gespritzt
- z.B. Buchsbaum 3m hoch Standraum 4 x 4 m = 16m² = 53% bzw. 0,53 (von 30m² (16/30)) = 3 m * 1Liter * 0,53(53%) = 1,59 l Spritzbrühe

Bei Echtem Mehltau an Weinreben

- wird das Mittel 0,04% (4ml / 1 Liter Wasser) gespritzt
- darf das Mittel max. 4 x / Jahr eingesetzt werden.
- muss mit der Ernte der Früchte mindestens 28 Tage gewartet werden.

Anwendung der Spritzbrühe

- Während der Arbeit nicht essen und trinken
- Handschuhe, festes Schuhwerk und geschlossene Kleidung tragen
- Hälfte des Wassers in die Spritze füllen
- Mittel unter Rühren hinzugeben
- Rest Wasser hinzugeben
- Pflanzen behandeln
- Sollten Reste der Spritzbrühe überbleiben, auf der kompletten behandelten Fläche erneut ausbringen.
- Danach die Spritze mit klarem Wasser füllen und auf der vorher behandelten Fläche leer spritzen