

Spezial-Pilzfrei Aliette® (Fungizid, Pilzmittel)

Anwendungsgebiete

Das Mittel wird eingesetzt gegen Wurzelfäule, Welke sowie Falscher Mehltau an Erdbeere, Gurken, Kopfsalat und Zierpflanzen.

Die Anwendung muss mit einem Abstand von mindestens 5m zu Gewässern erfolgen, da das Mittel giftig für Wasserorganismen ist.

Anwendung

Bei Zierpflanzen gegen Falschen Mehltau, oder Wurzelfäule

- wird das Mittel mit 0,25% (1 Portionsbeutel / 4 Liter Wasser) gegossen
- darf das Mittel max. 6 x / Jahr eingesetzt werden
- wird mit 1 Liter Spritzbrühe auf 2m² gegossen

Bei Gurken gegen Falschen Mehltau

- wird das Mittel mit 0,5% (1 Portionsbeutel / 2 Liter Wasser) gespritzt
- darf das Mittel max. 3 x / Jahr eingesetzt werden
- wird mit 6 Liter Spritzbrühe auf 100m² gespritzt
- Wartezeit bis zur Ernte der Früchte 4 Tage

Bei Kopfsalat im Freiland gegen Falschen Mehltau

- wird das Mittel mit 0,5% (1 Portionsbeutel / 2 Liter Wasser) gespritzt
- darf das Mittel max. 3 x / Jahr eingesetzt werden
- wird mit 6 Liter Spritzbrühe auf 100m² gespritzt
- Wartezeit bis zur Ernte der Früchte 12 Tage

Anwendung der Spritzbrühe

- Während der Arbeit nicht essen und trinken
- Handschuhe, festes Schuhwerk und geschlossene Kleidung tragen
- Hälfte des Wassers in die Spritze füllen
- Mittel unter Rühren hinzugeben
- Rest Wasser hinzugeben
- Pflanzen behandeln
- Sollten Reste der Spritzbrühe überbleiben, auf der kompletten behandelten Fläche erneut ausbringen.
- Danach die Spritze mit klarem Wasser füllen und auf der vorher behandelten Fläche leer spritzen